


เพื่อความปลอดภัยในการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19

คำแนะนำเกี่ยวกับ
อาการข้างเคียงหลังฉีดวัคซีน
ที่ควรจดจำไว้!



หลังจากฉีดวัคซีน วิธีดังต่อไปนี้จะช่วยบรรเทาอาการได้



หากมีอาการบวมหรือปวดบริเวณที่ฉีดยา
ใช้ผ้าแห้งที่สะอาดมาวางและประคบเย็น



หากมีไข้ต่ำ ๆ ควรดื่มน้ำมาก ๆ
และพักผ่อนให้เพียงพอ




หากรู้สึกไม่สบายตัวเนื่องจากมีไข้หรือปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ
ควรรับประทานยาลดไข้หรือยาแก้ปวด
เพื่อบรรเทาอาการ

* ก่อนฉีดวัคซีน ควรเตรียมยาลดไข้หรือยาแก้ปวดที่มีสาร Acetaminophen (หรือพาราเซตามอล) ไว้ล่วงหน้า
และเมื่อมีอาการปวดเมื่อยตัวหลังฉีดวัคซีน ควรรับประทานยาดังกล่าว

หากเกิดอาการดังต่อไปนี้ ควรไปพบแพทย์

หลังจากการฉีดวัคซีน

- กรณีมีอาการบวม ปวด หรือระคายเคืองผิวนานกว่า 48 ชั่วโมงหลังการฉีดวัคซีน
- กรณีมีอาการหายใจลำบาก เจ็บบริเวณหน้าอก ปวดท้องตลอด ขาบวม ฯลฯ ภายใน 4 สัปดาห์หลังการฉีดวัคซีน
- กรณีมีอาการปวดหัวต่อเนื่องนานกว่า 2 วัน หรืออาการปวดไม่ดีขึ้น แม้รับประทานยาแก้ปวด หรือน้ำมดหลังการฉีดวัคซีน
- กรณีมีอาการไม่มีเรี่ยวแรงหรือมีอาการผิดปกติอื่น ๆ หลังการฉีดวัคซีน
- กรณีมีรอยฟกช้ำหรือเลือดไหลในจุดที่ไม่ใช่จุดที่ฉีดวัคซีน ภายหลังจากการฉีดวัคซีน



หากเกิดอาการดังต่อไปนี้ ควรโทรไปที่หมายเลข**119** หรือไปที่แผนกฉุกเฉินของโรงพยาบาล

- กรณีหายใจไม่ออกหรือเวียนศีรษะอย่างรุนแรงหลังการฉีดวัคซีน
- กรณีที่ปากหรือหน้าบวมหรือมีลมพิษขึ้นอย่างรุนแรงทั้งตัวหลังการฉีดวัคซีน
- กรณีหมดสติหรือเป็นลมหลังการฉีดวัคซีน

