

缩短追加接种间隔 及30岁以下建议接种辉瑞疫苗

考虑到重症死亡危险性，缩短追加接种的【助推器镜头】接种间隔

目标群	建议接种间隔	
	现行	更改
60岁以上	6个月	4个月
感染脆弱设施 入所·从业者 ¹⁾		
疗养医院·设施 住院·入所·从业者		
基础疾病患者(18-59岁)		
病·医院等 医疗机构从业人员	6个月	5个月
50年龄段		
优先接种 职业群 ²⁾		
杨森疫苗 接种者	2个月	2个月 (无更改)
免疫力低下者 ³⁾		

1) 老年人设施(住宅、白天/夜间/短期保护)、残疾人设施(居住/日间保护)、老年护理共同生活家庭、结核病·麻风病人居住设施、露宿者居住和使用设施

2) 军人、警察、消防、海警、保健医务人员、特殊保育和托儿所护理人员、特殊教育和保健教师、矫正设施 等 从业人员、航空乘务员等

3) 急性白血病、免疫抑制治疗中的患者 等

○ 预约对象在本人可接种时间2周前，可在新冠病毒19预防接种事先预约网民(<https://ncvr.kdca.go.kr>)预约(11.22(星期一)以后)

* 12.6天(星期一)以后可以选择接种日期

○ 预约时间到来时，将分别以文字告知 对象与否及预约方法

30岁以下('92.1.1. 以后出生)基本(1-2次)接种时 建议接种辉瑞疫苗

○ 在一些国家，摩德纳疫苗的心肌炎、心囊炎的发生高于辉瑞疫苗，所以主动应对

阶段性 日常恢复带来的 新冠病毒19危险度评

○ 以医疗应对能力为中心，根据对各种指标的综合风险评估，采取日常 恢复阶段 或实施非常计划等措施

每周评价，为期4周的阶段评价之后决定 是否履行日常恢复