

ການພື້ນຖານປະຈຳວັນເທື່ອລະກ້າວ ຂຶ້ນຕອນທີ 1 ການຈັດຕັ້ງໃໝ່ (ວັນທີ1 ເດືອນພະຈິກ ~)

ການຕິດຕາມ ການຮັບມື (ວັນທີ29 ເດືອນພະຈິກ ~)

- ການພິຈາລະນາ ແນວໂນ້ມການລະບາດ, ເຊັ່ນການເພີ່ມຂຶ້ນຂອງກໍລະນີຜູ້ຕິດເຊື້ອຢ່າງໄວວາ, ການຈັດລະບຽບໃໝ່ ຄັ້ງທີສອງ ແມ່ນໄດ້ຖືກເລື່ອນອອກໄປ.
 - ສິ່ງເສີມແຜນການຮັບມື ດ້ານການແພດແລະການກັກກັນໃນຂະນະທີ່ຮັກສາລະດັບປະຈຸປັນເປັນເວລາ 4 ອາທິດ ກ່ອນທີ່ຜົນການກະຕຸ້ນຂອງການສັກຢາວັກຊີນຈະມີຜົນປະກົດ.
- ການປັບປ່ຽນເປັນການປົນປົວຢູ່ເຮືອນ
 - ລະບົບທີ່ຄົນເຈັບໄດ້ຮັບການອະນຸຍາດໃຫ້ເຂົ້າໃນສະຖາບັນການແພດພຽງແຕ່ໃນກໍລະນີພິເສດ, ທີ່ຄົນເຈັບບໍ່ສາມາດທີ່ຈະປົນປົວຢູ່ເຮືອນໄດ້.
 - < ທີ່ມີຢູ່ແລ້ວ >

< ການປັບປຸງ >

(ເປົ້າໝາຍ) ຜູ້ທີ່ມີອາຍຸຕໍ່າກວ່າ 70 ປີ ທີ່ບໍ່ມີປັດໃຈເຂົ້າໂຮງໝໍ, ກໍລະນີທີ່ຍືນຍັນບໍ່ເປັນອາການ ແລະ ກໍລະນີບໍ່ຮຸນແຮງ, ຜູ້ທີ່ໄດ້ຍິນຍອມໃຫ້ການປົນປົວຢູ່ເຮືອນ.

- (ເຫດຜົນສໍາລັບການຍົກເວັ້ນ) ກໍລະນີສະພາບແວດລ້ອມຂອງການດໍາລົງຊີວິດມີຄວາມສ່ຽງຕໍ່ການຕິດເຊື້ອ, ກໍລະນີພິພະຍາດເບື້ອງຕົ້ນ, ກໍລະນີຜູ້ທີ່ບໍ່ໄດ້ຮັບການສັກຢາ ປ້ອງກັນທີ່ມີອາຍຸເກີນ 60 ປີ, ໃນກໍລະນີທີ່ອາໄສຢູ່ຮ່ວມກັນກັບ ຜູ້ທີ່ປົນປົວຢູ່ໂຮງໝໍ, ແລະ

(ເປົ້າໝາຍ) ທັງໝົດກໍລະນີທີ່ຍືນຍັນຕິດເຊື້ອ Covid19

- ເຖິງແນວໃດກໍຕາມ, ຖ້າມີກໍລະນີປົນປົວຢູ່ໂຮງໝໍ, ມີການມືນເມົາຈາກການຕິດເຊື້ອ
- ການປົນປົວຄົນເຈັບພາຍໃນ ສໍາລັບຜູ້ປ່ວຍທີ່ຕ້ອງການດູແລ (ເດັກນ້ອຍ, ຄົນພິການ, ອາຍຸສູງກວ່າ 70 ປີ, ແລະອື່ນໆ).

- ບົກສາຫາລືໄດ້ຕະຫລອດ 24 ຊົ່ວໂມງໃນກໍລະນີສຸກເສີນ. ສ້າງຕັ້ງສາຍດ່ວນເພື່ອປົນປົວ. ຈັດຕັ້ງສະຖາບັນການແພດເຄື່ອນທີ່ ລ່ວງຫນ້າ

- ຊຸກຍູ້ໃຫ້ຜູ້ທີ່ບໍ່ໄດ້ສັກຢາວັກຊີນ ແລະປະຕິບັດການສັກຢາປ້ອງກັນ (ວັກຊີນກະຕຸ້ນ) ໂດຍໄວ
 - ການຊຸກຍູ້ຜູ້ທີ່ຍັງບໍ່ທັນໄດ້ຮັບການສັກວັກຊີນ
 - ການສືບຕໍ່ການຈອງລ່ວງຫນ້າສໍາລັບເດັກນ້ອຍແລະໄວລຸ້ນ (ອາຍຸ 12-17) (~ ວັນທີ 22 ມັງກອນ, ປີ 2022.), ການສັກຢາປ້ອງກັນໂດຍຜ່ານການເຊື່ອມໂຍງຂອງໂຮງຮຽນ - ສະຖາບັນຂຶ້ນຢູ່ກັບສະພາບຂອງທ້ອງຖິ່ນ (ຈັດໂດຍຫ້ອງການສຶກສາ)
 - ການຮ່ວມມືກັບສະມາຄົມທາງການແພດ ແລະ ຊຸກຍູ້ໃຫ້ມີການສັກຢາປ້ອງກັນຢ່າງຫ້າວຫັນຂອງຜູ້ສູງອາຍຸ ທີ່ໄປຢ້ຽມຢາມສະຖາບັນການແພດເປັນປະຈຳເພື່ອການປົນປົວພະຍາດອື່ນໆ

- ການດຳເນີນການສັກຢາວັກຊີນກະຕຸ້ນຢ່າງໄວວາ
- ໃນເດືອນທັນວາ, ໄລຍະການສັກຢາປ້ອງກັນຢ່າງເຂັ້ມງວດສຳລັບຜູ້ສູງອາຍຸ(ອາຍຸຫຼາຍກວ່າ60ປີ) ແມ່ນໄດ້ຮັບດຳເນີນການ ຄ້າຍຄືກັບການສັກຢາປ້ອງກັນໄຂ້ຫວັດໃຫຍ່, ການສັກຢາປ້ອງກັນໃນມື້ດຽວກັນແມ່ນ ປະຕິບັດໂດຍບໍ່ມີການຈອງລ່ວງຫນ້າ.
- 5ເດືອນ(150ມື້)ຫຼັງຈາກການສັກຢາປ້ອງກັນຂັ້ນພື້ນຖານສຳລັບທຸກຄົນທີ່ສຳເລັດການສັກຢາວັກຊີນຂັ້ນພື້ນຖານ ທີ່ມີອາຍຸເກີນ 18 ປີ.

ການປະຕິບັດການສັກຢາປ້ອງກັນ (ການກະຕຸ້ນ)ເປັນມາດຕະຖານ

- ກຳນົດໄລຍະເວລາທີ່ຖືກຕ້ອງ(6ເດືອນ)ສຳລັບປັດກັກກັນ(ໃບຢັງຍືນການສັກວັກຊີນ), ແລະການສັກຢາວັກຊີນເພີ່ມເຕີມແມ່ນມີຄວາມຈຳເປັນພາຍໃນ6 ເດືອນເພື່ອນຳໃຊ້ສະຖານທີ່ອ່ານວຍຄວາມສະດວກຕ່າງໆທີ່ຕ້ອງມີປັດກັກກັນ.
- ບຸກຄົນ(ການປົນປົວພະຍາດ, ການອອກໄປຕ່າງປະເທດ, ແລະອື່ນໆ), ການສັກຢາປ້ອງກັນເປັນກຸ່ມ (ສະຖານທີ່ມີຄວາມສ່ຽງຕໍ່ການຕິດເຊື້ອ, ສະຖາບັນການແພດ, ແລະອື່ນໆ). ແລະປັນດາທ່ານທີ່ຕ້ອງການຮັບວັກຊີນຕົກຄ້າງແມ່ນສາມາດຮັບວັກຊີນໄດ້ພາຍໃນ1ເດືອນສິນທຽບກັບມາດຕະຖານສຳລັບການສັກວັກຊີນເພີ່ມເຕີມໂດຍກຸ່ມເປົ້າໝາຍ.

*(4 ເດືອນສຳເລັດການສັກວັກຊີນພື້ນຖານ) ອາຍຸ 60 ປີຂຶ້ນໄປ, ຜູ້ທີ່ມີພະຍາດປະຈຳຕົວ, ສະຖາບັນການແພດ, ສະຖານທີ່ສ່ຽງຕໍ່ການຕິດເຊື້ອ (5 ເດືອນສຳເລັດການສັກວັກຊີນຂັ້ນພື້ນຖານ)

18-49 ປີ, 50 ປີ (2 ເດືອນສຳເລັດການສັກ ວັກຊີນພື້ນຖານ) ຜູ້ທີ່ສັກຢາວັກຊີນ Janssen, ຜູ້ທີ່ມີພູມຕ້ານທານຫຼຸດລົງ.

ເພີ່ມທະວີການກັກກັນ

- ການເສີມສ້າງການກວດສອບ PCR ສຳລັບສະຖານທີ່ທີ່ມີຄວາມສ່ຽງຕໍ່ການຕິດເຊື້ອເຊັ່ນ: ພະຍາບານປະຈຳໂຮງຫມໍແລະສັງຄ່ານວຍຄວາມສະດວກຕ່າງໆ*, ໂດຍເນັ້ນໃສ່ຜູ້ທີ່ສຳເລັດການສັກຢາວັກຊີນເພີ່ມເຕີມ

*(ມີຢູ່ແລ້ວ)ການກວດສອບPCRຄັ້ງດຽວ(ເວລາຢູ່ໂຮງຫມໍ)+ 1ມື້ ຢູ່ໃນຫ້ອງແຍກປ່ຽວ.

→ (ປ່ຽນແປງ) ການກວດສອບ PCR ສອງຄັ້ງ (①ເມື່ອເຂົ້າໂຮງຫມໍ, ໃນມື້ທີ3 ຂອງການກັກກັນ) + ລໍຖ້າ 4 ມື້ຢູ່ໃນຫ້ອງກັກກັນ.

- ສະຖານທີ່ສະຫວັດດີການ ການຜ່ອນຄາຍສຳລັບຜູ້ສູງອາຍຸ (ສູນຜູ້ອາວຸໂສ, ສູນສະຫວັດດີການຜູ້ສູງອາຍຸ, ແລະອື່ນໆ) ຫ້າມຈັດກິດຈະກຳກິນອາຫານຈິລະດູຫນາວ.

<ການແປພາສານີ້ໄດ້ເຮັດຢູ່ທີ່ສູນກາງໂທລະສັບ ດານູຣີ 1577-1366>